

İmal tarihi :
Sarıj No :
Son kullanma tarihi :
Ruhşat tarih ve No'su :



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

KASTORIA SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	G ₁ ,3	B ₁ ,1	Fungusit (Mantar İlacı)
187 g/l Epoxiconazole + 310 g/l Thiophanate-methyl			

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Şeker pancarı	Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	50 ml/da	28 gün
Bugday	Sarı Pas (<i>Puccinia striiformis</i>) Tahıl külliemsi (<i>Erysiphe graminis</i>) Septoria yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	60 ml/da 60 ml/da 60 ml/da	35 gün 35 gün 35 gün

Önce Etiketi Okuyunuz

Evde Kullanınmayınız

Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz

Bitki Koruma Ürünü Buharını ve Zerrelerini Tenefüs Etmemeyiniz.

Uygulama Eşnasında Hiçbir Şey Yemeyiniz İcmeyiniz. Sigara Kullanmayın.

Deri ve Göz İle Temasından Kaçınınız

Rüzgarlı Havada Uygulama Yapmayıza Sıkılmayınız.

Uygulama Yapılmış Sahaya 1 Gün İnsan ve Hayvan Sokmayın.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DISINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan Bitki Koruma Ürünü Boş Ambalajının Dörtte Birine Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi Üç Kez Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solumması halinde maruz kalan kişiyi ortadan uzaklaştırır, temiz havaya çırkınlı. Nefes alamayorsa ambulans çağrırin ve mümkinse suni nefesini yapın. Dırhal tıbbi yardım alın.

Deri ile temasında kirli kıyafetleri çırkınlı. Temas etmiş bölgeleri bol miktarda su ile yıkayınlı. Sonrasında bol su ve sabun ile yıkayınlı kuruyayın, tıbbi olursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde maruz kalan gözü, göz kapaklıları açık olacak şekilde ve göz yaralarından mümkin olduğunda uzaklaştırıralı, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayınlı. Varsa ve koluya ıskalabilse kontak lensleri çıkarın ve yıkayınlı sürtürün.

Fabriş oluşursa tıbbi yardım alın.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini kalıştırarak tüm parçaların yıkandırmayı sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayıiz. Yıkama suyunu ve arıkları su kaynaklarına boşaltmayıiz.

ÖZELLİKLER:

GBF su gösteriniz ve tıbbi yardım alın. Tibbi olarak önerilmelidir.

Çalkalama ve bol miktarda su içirin. Genel durum değerlendirilmesi yarım saatlik bir süreyle göre tedavi uygulanır.

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ :

ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

14 Eylül 2017

GIDA TARIM VE HAYVANÇULUK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARABUL EDİLMİSTİR.

Dr. Emin YILMAZ
Genel Müdür Yardımcısı
Özel bir antidot yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ :

SUNSET KABAŞ KİYOGLU
ve ALJ. İmza: STİ
Adres: İstiklal Mah. 5. Sokak no: 12/A
İzmir - 35430
Tel: 0232 394 50 72
Fax: 0232 394 50 73

Net miktar: (kg veya l)
Azami perakende satış fiyatı:


İÇİNDEKİLER:

Epoxiconazole
Thiophanate-methyl

ZARARLILIK İŞARETLERİ:




UYARI KELİMESİ: TEHLIKE



ZARARLILIK İFADELERİ:



ÖNEMLİ İFADELERİ:



SUNSET KABAŞ KİYOGLU
ve ALJ. İmza: STİ
Adres: İstiklal Mah. 5. Sokak no: 12/A
İzmir - 35430
Tel: 0232 394 50 72
Fax: 0232 394 50 73

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKLÜ:
ŞEKERDÇANI YAPRAK LEKE HASTALığı:**

Sekerdçanı erişkin yapraklarının % 5 inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk ilaçlama başları. 15-20 gün aralıkları devam edilir.

BUĞDAY SARI PAS:

Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamala başları. Pas etmenlerine karşı yesil aksam ilaçlanması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi laç su ile kaplanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalık durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla ilaçlamaları devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma döneminde girdiğiinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

BUĞDAYDA SEPTORYA YAPRAK LEKEŞİ:

Eğer iklim koşulları hastalığın gelişimine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yesil aksam ilaçlaması uygun olmalıdır. Genel olarak döneminin sonu veya başlangıç öncesidır. Erken dönemde bitkinin üst kusurlarına doğru turmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çktığı beklenmelidir. Aynı şekilde, tarla buluşksa ve basaklıma döneminde yaşlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir. İlaçlammanın tekrarlanması gerektiği durumlarda, bitki koruma ürününe etiketinde belirtilen etki süresi dikkate alınmalıdır.

BUĞDAYDA TAHIL KÜLLEMESİ:

İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle ilaçlanması bulasmasını engellemek amacıyla yesil aksam ilaçlamasına baslanmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

KASTORIA SC adlı bitki koruma ürünü, etki nekanızmasına göre, Grup G₁;B₁;1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulanaları, direnç gelişiminin teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçitirmek için KASTORIA SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplan uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlamaması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına salıp (Grup G₁;B₁ hariç).

KARIŞABILİRLİK DURUMU:

Alphacypermethrin terkipi ilaçlarla karıştırılarak uygulanabilir. Karışımın bekletilmesinden uygulanmaya geçilmelidir.

KASTORIA SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU | G₁;3 | B₁;1 | Fungusit (Mantar İlacı)

187 g/l Epoxiconazole + 310 g/l Thiophanate-methyl

bulaştırmaktan kaçınınız.

-Balkalar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sulanma uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kurut) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyojistik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçların kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçların hatalı depolannması veya tavyisiyleye uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluğu kabul etmezler.

RÜHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FIRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İML. PAZ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tel: 0322 3945171-72 Fax: 0322 381 8773
Sarıçam/ADANA
Tel: 0322 3945171-72 Fax: 0322 381 8773

**SUNSET KİMYA
ve ALT İML. PAZ. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tel: 0322 3945171-72 Fax: 0322 381 8773
Sarıçam/ADANA
YÜREĞİNDİ, 784 028 7261**




14 Eylül 2017