

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi: ( " )  
Şarj No: (Damga ile)  
Ruhsat tarihi ve numarası: 03.04.2019 /11350

#### KULLANILACAK İTİKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı        | Zararlı Organizma Adı                                    | Uygulama Dozu           | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Pamuk            | Tütün beyazsineği<br>( <i>Bemisia tabaci</i> )           | 350 ml / da Larva-Ergin | -                                      |
| Biber<br>(Tarla) | Tütün beyazsineği<br>( <i>Bemisia tabaci</i> )           | 300 ml/da Larva-Ergin   | 7 gün                                  |
| Biber<br>(Sera)  | Sera beyazsineği<br>( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) | 300 ml/da Larva-Ergin   | 7 gün                                  |
|                  | Tütün beyazsineği<br>( <i>Bemisia tabaci</i> )           | 300 ml/da Larva-Ergin   |                                        |
| Domates          | Tütün beyazsineği<br>( <i>Bemisia tabaci</i> )           | 300 ml/da Larva-Ergin   | 7 gün                                  |

#### İTİKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

17 Ağustos 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



# ANECDOT® EC

Emülsiyon konsantre (EC)

| Grup | 16 | 3A | Insektisit (Böcek ilacı) |
|------|----|----|--------------------------|
|------|----|----|--------------------------|

100 g/L Buprofezin + 20 g/L Lambda-cyhalothrin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ  
EVDE KULLANMAYINIZ  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

İTİKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA  
HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİĞARA KULLANMAYINIZ.  
İTİKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN  
VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN  
TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA  
KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN İTİKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ 1/4'Ü  
KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.  
ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU  
İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ VE TEDAVİ:

**Göz:** Temas halinde 15–20 dakika göz açırken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Yutma:** Ağzı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayınız. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmaz ve kusturulmaz. Derhal doktora başvurun.

**Solunum:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

**ANTİDÖTÜ:** Özel bir antidotu yoktur.

\*SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML. PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.  
firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

#### İÇİNDEKİLER:

Buprofezin, Lambda-cyhalothrin

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



#### TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226 Alevlenir sıvı ve buhar  
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.  
H315 Cilt tahrişine yol açar.  
H331 Solunması halinde toksiktir.  
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210 Isıdan/ıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.  
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.  
P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.  
P280 Korumayı eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P501 İçerik/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

**EU404** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
/E/İFADELERİ İMALATÇI SAĞLIK  
ORGANİZME Sekt. ELİMANİ ÇELİK YOLU  
FNC TANIŞTIRMA BÖLÜMÜ NİGDE  
Bölge Müdürü 0366 17865  
Mesaj No: 07/840617865

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta Tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğu müdahaleye başlanmalıdır.

Biberde Tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğu kimyasal mücadele uygulanır.

Domateste Tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğu kimyasal mücadele uygulanır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** ANECDOT® EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 16, 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geiktirmek için ANECDOT® EC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 16, 3A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU:

Karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa ilaçların ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.



# ANECDOT® EC

Emülsiyon konsantre (EC)

| Grup | 16 | 3A | Insektisit (Böcek ilacı) |
|------|----|----|--------------------------|
|------|----|----|--------------------------|

100 g/L Buprofezin + 20 g/L Lambda-cyhalothrin

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılarla zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınız.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Bitki koruma ürünü kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz, hiçbir şey yemeyiniz.
- Gözlük kullanınız. Sulandırılmış bitki koruma ürünü gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız. İlk yardım tedbirlerine bakınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ

VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.

FNC Tarım Blok No:6 Bor/NİGDE

Tel: (0 388) 999 16 06

Fax: (0 388) 999 16 19

#### ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.

No:6 Bor/NİGDE

Tel: (0 388) 999 16 06

Fax: (0 388) 315 00 89



SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
VE ALAETLERİ İMALAT, TİCARET VE TİC.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2/B Nolu Yol Cd  
FNC Tarım Blok No:6 Bor / NİGDE  
Bor / NİGDE 04 061 7865  
Mersis No: 07840617865



17 Ağustos 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.