

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 18.05.2016/10644

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Kayıs Şeftali	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Delice (<i>Lolium temulentum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası, Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede 300 ml/da Çıkış sonrası, Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	300 ml/da Çıkış sonrası, 4-6 yapraklı dönem
Zeytin	Duvar arpası (<i>Hordeum murinum</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Gri lekeli amarant (<i>Amaranthus lividus</i>) Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Kırmızı çiçekli ballıbab (<i>Lamium purpureum</i>) Turnagagası (<i>Geranium dissectum</i>) Kuşotu (Serçe dili) (<i>Stellaria media</i>) Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>) Yabani yonca (<i>Medicago polymorpha</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre
Turuncgiller	Yeşil horozibizi (<i>Amaranthus viridis</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Isırgan otu (<i>Urtica urens</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Adi eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>) Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Duvar arpası (<i>Hordeum murinum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Tüysüz hanım döşegi (<i>Euphorbia serpens</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani bamy (<i>Hibiscus trionum</i>) Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası, Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre


SUNSET
DEMERES® SC
Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	G,9 + E,14	Herbisit (Yabancıot ilacı)
-------	------------	----------------------------

360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate Isopropylamin Tuzu + 30 g/l Oxyfluorfen

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHIRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Hastayı sakın tutun. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Hastayı sabunlu veya tuzlu su ile kusturun. Hastayı ve ürünün ambalajını derhal doktora gösterin. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

®SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. firmasının ticareti markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Glyphosate Isopropylamin Tuzu
Oxyfluorfen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



ZARARLILIK İFADELERİ:

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Komşu tarlalara temasından kaçınınız.
- Boş ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

24 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.


Daire Başkanı V.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

DEMERES® SC seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan total bir herbisittir. Bu nedenle uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır. Hazırlanan ilaçlı mahlül, yabancı otların üzerine püskürtülür. En iyi sonuç, yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönemde ilaçlama yapılarak elde edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DEMERES® SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G,9 ve E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DEMERES® SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G,9 ve E,14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

**DEMERES® SC**

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	G,9 + E,14	Herbisit (Yabancıot ilacı)
-------	------------	----------------------------

360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate
Isopropylamin Tuzu +
30 g/l Oxyfluorfen

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışından bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT. İML. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2B Nolu Yol Cad.
FNC Tarım Blok No:6 Bor/Niğde
Tel: (0388) 999 16 06
Fax: (0388) 999 16 19

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
Gebze / KOCAELİ
Tel: (0262) 751 14 12
Fax: (0262) 751 14 22



24 Eylül 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
[Signature]

