

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 11.06.2015 / 10282



FOÇA WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

GRUBU	M3	C3;11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----	-------	-------------------------

% 55 Metiram +% 5 Pyraclostrobin

Önce Etiketi Okuyunuz.

Evde Kullanmayınız.

Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.

Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.

Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.

İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edilen Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması halinde maruz kalan kişiyi ortamdaki uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. Nefes alamıyorsa ambulans çağırın ve mümkünse suni teneffüs yaptırın. Derhal tıbbi yardım alın.

Deri ile teması halinde kirli kıyafetleri çıkarın, bol su ile yıkayın ve kurulayın, tahriş olursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa 1-2 dakika sonra kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bu ürünün GBF'ni gösteriniz ve tıbbi yardım alın. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Hasta baygın değilse ağzını bol miktarda su ile çalkalattırın ve bol miktarda su içirin. Genel durum değerlendirilmesi yapıp, belirtilere göre tedavi uygulayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süresi
Bağ *	Mildiyö (<i>Plasmopora viticola</i>)	200g /100 L su	28 gün
	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	200g/100 L su	28 gün
	Ölülük (<i>Phomopsis viticola</i>)	150g/100 L su	28 gün
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde Mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250g /100 L su	7 gün
Domates (Sera)	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	200g/100 L su	3 gün
Karpuz (Sera)	Alternarya yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucumerina</i>)	200g/da	7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Net miktarı: (kg veya l)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Metiram, Pyraclostrobin, Alkil arilsülfonat kalsiyum tuzu

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315-Cilt tahrişine yol açar.

H317-Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318-Ciddi göz hasarına yol açar.

H411-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELER:

P101-Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261-Tozunu solumaktan kaçının.

P273-Çevreye verilmesinden kaçının.

P280-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501-İçeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401-İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

AB Alınmayan
SUNSET KİMYA KURUMU
ve ALT, İML, PAZ, SATI ve TIC LTD. ŞTİ.
Adana Hacı Saban Organize San. i Bölgesi
Toros Cad. No: 11 - Sarıçam/ADANA
Tel: 0322 394 51 71 - 72 Fax : 0322 394 51 73
YÜREĞİR V.D. 784 028 7284

14 Aralık 2017
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Küllemesi:

1. İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve koruklar saçma tane iriliği olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme döneminde yapılır.

Bağ Mildiyö; İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ Ölükol;

Yaz ilaçlaması:

1. İlaçlama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. İlaçlama: Sürgünler 25-30 cm 'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Domates (Sera) Mildiyö:

İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görünmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerde, hasatlık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve ilacın etkinlik süresine göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Hıyar (Sera) Kabakgillerde Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Karpuz(Sera) Alternarya Yaprak Yanıklığı:


Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FOÇA WG, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup M3, C3;11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FOÇA WG** yerine takip eden sezonda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3, C3;11 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılmadan ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması gerekmektedir.



FOÇA WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

GRUBU	M3	C3;11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	----	-------	--------------------------

% 55 Metiram +% 5 Pyraclostrobin

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI VERUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜN.VE ALET. İML. PAZ. SAN.VE TİC. LTD.
ŞTİ. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No:11
Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 39451 71-72 Fax: 0322 394 51 73

ALT. İML. PAZ. SAN.VE TİC. LTD.
KARAKÖKÇÜOĞLU
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Toros Cad. No:11 - Sarıçam/ADANA
Tel: 0322 394 51 71-72 Fax: 0322 394 51 73
YÜREĞİ V.D. 784 028 7284

AN

14 Aralık 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

