

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 10.09.2013/9322

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği (Çıkış öncesi)	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken-Iştır (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>)	Geniş yapraklı y. otlarda: 200 ml/da Darıcan otuna: 300 ml/da Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
Ayçiçeği (Çıkış sonrası)	Sirken-Iştır (<i>Chenopodium album</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneminde	49 gün
Havuç	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken-Iştır (<i>Chenopodium album</i>) Portulaca oleracea (<i>Portulaca oleracea</i>) Yabani semizotu (<i>Setaria viridis</i>) Yeşil kirpi darı (<i>Sinapis arvensis</i>) Yabani hardal (<i>Sonchus arvensis</i>) Eşek marulu	150 ml/da Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
Nohut	Sirken-Iştır (<i>Chenopodium album</i>) Dilkanatan (<i>Galium aparine</i>) Sarmaşık (<i>Polygonum convolvulus</i>) Çobanistan (<i>Rapistrum rugosum</i>) Küçük turp (<i>Sinapis arvensis</i>) Yabani hardal	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	49 gün
	Dikenli yabani marul (<i>Lactuca serriola</i>)	75 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	
Mercimek (Çıkış öncesi)	Gönül hardal (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	250 ml/da 300 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	-
Mercimek (Çıkış sonrası)	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	49 gün
	Gönül hardal (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Sarmaşık (<i>Polygonum convolvulus</i>) Çobanistan	150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde	

Daire Başkanı
15 Aralık 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



SCREEN® 600 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	F3	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
-------	----	-----------------------------

600 g/l Aclonifen

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde Maruz kalan kişiyi ortamdan uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. Gerekliyse suni teneffüs yaptırın. tıbbi yardım alın.

Deri ile teması halinde Kirliliği kıyafetleri çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol miktarda su ve sabun ile yıkayın ve kurulayın, tahriş olursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bu ürünün GBF' nu gösteriniz ve tıbbi yardım alın. Maruz kalan kişinin nefes alıp almadığını kontrol edin. Hastayı dinlendirin ve vücut ısısını korumasını sağlayın. Baygın olan kişiye ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Aclonifen

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317-Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318-Ciddi göz hasarına yol açar.

H351-Kansere yol açma şüphesi var.

H410-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P201-Kullanmadan önce özel talimatları okuyun

P202-Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P261-Gazını/sisini/buharını/spreyi solumaktan kaçının.

P273-Çevreye salıverilmesinden kaçının.

P280-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501-İçeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401-İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.

-Balıklar için zehirlidir, yeryüzü ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Ürünü ambalajında kapalı olarak bulundurun.

Boşalan ambalajları başka bir amaç için kullanmayınız.

-SCREEN 600 SC bitki koruma ürünü yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe, Akçin, Sarı-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Çıta Anadolu gibi yerli çeşitleri gibi) güvenli kullanılabilir.

Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışın.

SUNSET İYİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
E ALETLERİ MALATYAZ SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Bölgesi Zib Nolu Yerleşke
FNC 061 061 7865
Borç 061 061 7865
Mersis 061 061 7865 0001

SELİM YILDIZ
GENEL MÜDÜR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SCREEN*600 SC yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe, Akçin, Sarı-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) güvenle kullanılabilir. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SCREEN*600 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup F3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SCREEN*600 SC aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

**SCREEN®600 SC****Süspansiyon Konsantre (SC)****GRUBU****F3****Herbisit (Yabancı Ot İlacı)****600 g/l Aclonifen****DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. FNC Tarım Blok
No:6 Bor/Niğde Tel: (0322) 394 51 71
Fax: (0322) 394 51 73

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700.Sok.
No:711/1 41400 Gebze/KOCAELİ
Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax: (0 262) 751 14 22

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2/B Nolu Yol Cad. FNC Tarım Blok
No:6 Bor/Niğde Tel: (0322) 394 51 71
Fax: (0322) 394 51 73
SELAMET KÖK
GENEL MÜDÜR

15 Aralık 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

39

