

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 15.05.2013/9213

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi					
Kimyon	Taşkesen otu ✓ Sirken ✓ Boynuzlu yoğurt otu ✓ Tarla düğün çiçeği ✓ Muhabbet çiçeği ✓ Soda otu ✓ Yapışkan nakıl ✓ Bülbül otu ✓ Pıtrak ✓	(<i>Buglossoides arvensis</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Galium tricornutum</i>) (<i>Ranunculus arvensis</i>) (<i>Reseda lutea</i>) (<i>Salsola ruthenica</i>) (<i>Silene conoidea</i>) (<i>Sisymbrium officinale</i>) (<i>Turgenia latifolia</i>)	200 ml/da Kültür bitkisi: 3-4 çatal döneminde, Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde				
	Soğan (Arpacık)	✓Kırmızı köklü tilkikuyruğu ✓ ✓Farekulağı ✓ ✓Sirken ✓ ✓Şeytan elması ✓ ✓Gönül hardalı ✓ ✓Gelinik ✓ ✓Çobanedeğneği ✓ ✓Sarmaşık çobanedeğneği ✓ ✓Yabani hardal ✓ ✓Yavşan otu ✓ ✓Zincir Pıtrağı ✓ (<i>Xanthium spinosum</i>)	(<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Anagallis arvensis</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Datura stramonium</i>) (<i>Myagrum perfoliatum</i>) (<i>Papaver rhoeas</i>) (<i>Polygonum aviculare</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Veronica spp.</i>)	150 ml/da Kültür bitkisi: 2-4 yapraklı döneminde, Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde			
		Anason	✓Kırmızı köklü tilkikuyruğu ✓ ✓Sirken ✓ ✓Sarmaşık çobanedeğneği ✓ ✓Kırmızı köklü tilkikuyruğu ✓ ✓Sirken ✓ ✓Darıcan ✓ ✓Sarmaşık çobanedeğneği ✓ ✓Yabani hardal ✓	(<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>) (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>)	175 ml/da Kültür bitkisi: Ekimden sonra, Yabancı otlar: Çıkış öncesi 150 ml/da Kültür bitkisi: Çıkış sonrası, Yabancı otlar: Çıkış öncesi		
			Havuç	✓Kırmızı köklü tilkikuyruğu ✓ ✓Sirken ✓ ✓Yabani hardal ✓ ✓Sarmaşık çobanedeğneği ✓ ✓Darıcan ✓ ✓Kırmızı köklü tilkikuyruğu ✓ ✓Sirken ✓ ✓Sarmaşık çobanedeğneği ✓ ✓Yabani hardal ✓	(<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Polygonum convolvulus</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>)	175 ml/da Kültür bitkisi: Ekimden sonra, Yabancı otlar: Çıkış öncesi 150 ml/da Kültür bitkisi: Çıkış sonrası, Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde	
				Nohut	✓Horozibiği ✓ ✓Yabani hardal ✓ ✓Sirken ✓ ✓Semizotu ✓	(<i>Amaranthus albus</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Portulaca oleracea</i>)	200 ml/da Kültür bitkisi: Ekimden sonra, Yabancı otlar: Çıkış öncesi



POKER® 45 SC
Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2,7	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

450 g/l Linuron

Önce etiketi okuyunuz.
Evede kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz,
içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan
sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği
şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su
koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına
boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. ✓

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su veya göz
solüsyonu ile yıkayın.
Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. Bitki koruma ürünü değen
vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın.
Yutma: Doktor veya zehir merkezini arayınız. Hastayı kusturmaya
çalışmayın.
Solma: Uzun süre teneffüs edilmesi halinde hastayı bitki koruma
ürünü uygulanmış sahadan uzaklaştırın. Sıcak ve dinlenme
pozisyonunda tutun. Tıbbi yardımda bulunun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
firmasının tescilli markasıdır.

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Linuron

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H360Df Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye
zarar verme şüphesi var.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol açabilir.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P405 Kilit altında saklayın.
✓ **P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
✓ **P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
✓ **P501** İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf
edin.
✓ **EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:**

- ✓ Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- ✓ Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına
bulaştırmaktan kaçınınız.
- Komşu kültür bitkilerine bulaşmamasına dikkat ediniz.
- Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle
kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü
koymayınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
E ALETLERİ VE İTFAH SAĞ. VE TİC.A.Ş.
Organize San. Bö. 1. Cad. Nolu Yol Cd
FNC Tarım İş. Bor / NİGDE
Bölge Tel: 0384 061 7865
Müşteri No: 07840617865

SELAMİ YILDIZ
GENEL MÜDÜR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
16 Kasım 2021



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çıkış öncesi uygulama: Ekimden sonra 1-2 gün içerisinde yapılır. Uygulama esnasında toprak keseksiz olmalıdır. Bitki koruma ürünü uygulanmış alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin topraklarda bitki koruma ürünü daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ise ürünü kullanılırken dikkatli olunmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.

Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç ay içinde toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bundan dolayı müteakip sene ekilen kültür bitkisinde zararlı olmaz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

POKER® 45 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2,7 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **POKER® 45 SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2,7 hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



POKER® 45 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	C2,7	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

450 g/l Linuron

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad FNC
Tarım . No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700.Sok.
No:711/1 41400 Gebze/KOCAELİ
Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax: (0 262) 751 14 22



SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2/B Nolu Yol Cad FNC
Tarım . No:6 Bor / NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

SELAMİ YILDIZ
GENEL MÜDÜR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

16 Kasım 2021

[Handwritten signature]

